

دسته دارویی : ضد ویروس (۱)
 این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی :

مصرف این دارو در موارد زیر با احتیاط صورت گیرد :

- در دوران بارداری یا شیردهی
- در صورت وجود سابقه حساسیت به دارو
- در صورت اختلالات شدید کبدی ، کلیوی و اختلالات الکترولیتی (۳و۴)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه B قرار دارد ، در خانم های شیرده به علت ترشح آن در شیر باید با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد. (۲)

هشدار ها و احتیاطات :

- در بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ایمنی ، به دلیل احتمال بروز سندرم ترومبوسیتوپنی پورپورا / همولیتیک اورمیک (TTP/HUS) ، مصرف آسیکلوویر باید با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص باشد.
- مصرف آسیکلوویر جهت درمان بیماری واریسلا زوستر می بایست طی ۲۴ ساعت پس از بروز راش جلدی صورت گیرد.
- این دارو ممکن است به علت کاهش کلیرانس کراتینین باعث اختلال عملکرد کلیوی شود لذا این دارو در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی باید با احتیاط مصرف شود.
- آسیکلوویر با داروهای پروبنساید ، تتوفیلین ، والپرویک اسید ، هیدانتونین ها و مایکوفنولات تداخل دارد.
- از مصرف همزمان آسیکلوویر با واکسن زوستر خودداری کنید زیرا آسیکلوویر باعث کاهش اثر این واکسن می شود.
- بیماران تحت درمان با این دارو می بایست آب و مایعات فراوان مصرف کنند. (۴و۵)

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف متداول آن به شرح ذیل می باشد :

بزرگسالان :

- هر پس تناسلی : ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز.
- هر س سیمپلکس : ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۱۰ روز.
- هر س سیمپلکس در بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ایمنی : ۵ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز.
- واریسلا زوستر : ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز. (۳)

کودکان :

- هر پس تناسلی : در کودکان بالای ۱۲ سال ، ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز.
- هر پس سیمپلکس : در کودکان بالای ۱۲ سال ، ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۱۰ روز.
- در کودکان ۳ ماه تا ۱۲ سال ، ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۱۰ روز.
- هر پس سیمپلکس در بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ایمنی : در کودکان بالای ۱۲ سال ، ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز.
- در کودکان زیر ۱۲ سال ، ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز.
- هر پس سیمپلکس نوزادی : از بدو تولد تا ۳ ماه ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۱۰ روز.
- واریسلا زوستر در بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ایمنی : ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز. در کودکان زیر ۱۲ سال ، ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز.

توجه :

جهت آماده سازی محلول ، ۱۰ میلی لیتر آب استریل برای تزریق (استفاده از آب باکتریواستاتیک حاوی بنزیل الکل و یا پارابن ها توصیه نمی گردد) را به محتویات ویال آسیکلوویر افزوده ، به خوبی تکان دهید تا محلول شفاف حاصل شود