

اولانتین®

الوپاتادین ۰/۶ درصد

اسپری بینی

مشخصات دارو:

اسپری بینی اولانتین® (الوپاتادین ۰/۶ درصد) به صورت محلول شفاف بیرنگ در بطری پلاستیکی ۲۰ میلی لیتری با پمپ اسپری و دریوش محافظ، درون جعبه مقوایی همراه با پروشور عرضه می شود.

موارد مصرف دارو:

الوپاتادین از دسته داروهای آنتی هیستامین ها می باشد و اسپری بینی آن در درمان علامتی آلرژی بینی ناشی از حساسیت فصلی به کار می رود.

راهنامه‌های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری کتونی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمائید. قبل از مصرف در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو و یا مواد جانبی آن، ابتلا، به بیماری های مختلف یا مصرف سایر داروهای پزشک را مطلع ننمائید.

موارد منع مصرف:

ندارد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی: (گروه C)

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی بایستی در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک انجام شود.

هشدارها:

در صورت ایجاد خونریزی بینی، زخم بینی و سوراخ در تیره میانی بینی پزشک را مطلع کنید. این دارو در افرادی که بیمارهای بینی غیر از حساسیت فصلی دارند نباید مصرف شود. بیماران باید به صورت دوره ای از نظر عوارض ایجاد شده در مخاط بینی مورد بررسی قرار گیرند.

احتیاطات:

هنگام مصرف این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به دقت دارند خودداری کنید.

این دارو را همزمان با الکل یا سایر داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مصرف نکنید.

برای جلوگیری از آلوده شدن دارو از تماس نوک اسپری با سطوح خارجی خودداری ننمائید. به منظور پیشگیری از انتشار عفونت، از هر اسپری بینی تنها برای یک بیمار می توان استفاده نمود.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری ننمائید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا

مراکز درمانی مراجعه کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروهای پزشک خود را مطلع کنید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

مقدار و چگونگی مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

کودکان بزرگتر از ۱۲ سال و بزرگسالان:

۲ پاف در هر سوراخ بینی روزی ۲ بار

کودکان ۶ تا ۱۱ سال:

۱ پاف در هر سوراخ بینی روزی ۲ بار

روش صحیح استفاده اسپری جهت مصرف داخل بینی:

قبل از استفاده از اسپری، حفره بینی را تمیز کنید.

۱- دریوش سر اسپری را بردارید.

۲- اسپری را مطابق شکل در دست بگیرید.

۳- سر را کمی به جلو خم نمائید. سر اسپری را داخل یکی از سوراخهای بینی قرار دهید و با دست، سوراخ دیگر بینی را مسدود نمائید. در حالیکه

از بینی و با دهان بسته تنفس می نمائید (در هنگام دم)، اسپری را تا انتها فشار دهید. این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمائید.

بعد از هر بار مصرف، دریوش اسپری را در جای خود قرار دهید.



عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موثرات اثرات مطلوب درمانی ممکن است در بعضی افراد موجب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض

در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت کنید. عوارض جانبی دارو شامل تلخ دهان،

سردرد، خواب آلودگی، سرفه، خونریزی بینی، زخم بینی، درد در ناحیه گلو و ترشحات پشت حلق می باشد.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید. دارو را به صورت ایستاده نگهداری کنید.

Pharmacode: 103

سینادارو
Sina Darou

سینادارو تهران - ایران