

قبل از مصرف در صورت داشتن سابقه حساسیت به داروهای ضدالتهاب استروئیدی و یا مواد جانبی این دارو، پزشک را مطلع نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه (C)، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط با نظر پزشک و اطلاع او از بارداری یا شیردهی مجاز می باشد. **عوارض جانبی:** سردرد، سوزش، خارش گذرا و خفیف بینی، خشکی بینی و گلو، خونریزی از بینی، خشکی یا تحریک بینی، دهان یا حلق، بثورات جلدی، احساس گرفتگی در سینه یا خس خس سینه **هشدار:** مصرف دارو در کودکان زیر ۴ سال توصیه نمی شود.

مقدار و چگونگی مصرف:

میزان مصرف معمول این دارو جهت درمان بیماری های بینی نظیر رینیت، آلرژیک یا غیر آلرژیک، فصلی یا دائمی، به شرح ذیل می باشد:

بزرگسالان: یک پاف (۵۰ میکروگرم) در هر حفره بینی، دو بار در روز، یا دو پاف (۱۰۰ میکروگرم) در هر حفره بینی یک بار در روز تجویز می شود. در مان نگهدارنده، یک اسپری در هر حفره بینی، یک بار در روز است و به صورت جایگزین برای رینیت فصلی دو پاف یک بار در روز استفاده می شود.

کودکان ۴ سال و بزرگتر از ۴ سال: در شروع درمان یک پاف (۵۰ میکروگرم) در هر حفره بینی، یک بار در روز تجویز می شود. اگر بیمار به در مان پاسخ ندهد و یا علائم بیماری شدید باشد، میزان مصرف به روزانه دو پاف (۱۰۰ میکروگرم) در هر حفره بینی افزایش می یابد. در صورت اطمینان از کنترل بیماری، میزان مصرف می تواند به یک اسپری (۵۰ میکروگرم) در هر حفره بینی، در روز کاهش یابد.

نکات قابل توصیه در زمان مصرف:

- ۱- قبل از مصرف، ظرف محتوی دارو را تکان دهید.
- ۲- دارو را بصورت منظم مصرف نموده، دوره در مان را کامل نمایید.
- ۳- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
- ۴- از قطع ناگهانی مصرف دارو بدون اطلاع پزشک خودداری نمایید.
- ۵- از تماس دارو با چشم پرهیز نمایید.
- ۶- قبل از استفاده از اسپری داخل بینی، حفره بینی را تمیز نمایید.
- ۷- در پوش روی سر اسپری را برداشته، اسپری را مطابق شکل در دست گرفته، سپس سر آن را کمی به جلو خم نمایید. سر اسپری را داخل یکی از سوراخ های بینی قرار دهید و با دست، سوراخ دیگر بینی را مسدود نمایید. در حالی که از بینی و با دهان بسته تنفس می نمایید (در هنگام دم)، اسپری را تا انتها فشار دهید. این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمایید. بعد از مصرف، در پوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

۸- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض بیاد آوردن، آن را مصرف نمایید. اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو فرارسیده است، از مصرف نوبت فراموش شده چشم پوشی نموده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید. **توجه:** وقتی اسپری را برای اولین بار استفاده می کنید و یا مدتی از آن استفاده نکرده اید، قبل از مصرف، یک پاف را بطور آزمایشی در هوا دور از چشم تخلیه کنید. قطعه پلاستیکی اسپری (اکچواتور) را هر چند روز یکبار بر حسب نیاز با آب ولرم شسته و سپس خشک نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- دارو را درون جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی معاف نگه دارید.
- پس از هر بار استفاده، در ظرف را محکم ببندید.

Reference: USP DI 2007