

Asmoral®

Montelukast Sodium

Tasnim
Pharmaceutical Co.

مونته لوکاست سدیم

قرص ۱۰ میل گرم

راهنمایی های عمومی:

- این فرآورده برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری کنید.
- دارو من تواند با یا بدون غذا مصرف شود.

موارد مصرف:

- برای بهبود علائم رینیت آلرژیک فصلی و پایدار
- پیشگیری و درمان طولانی مدت آسم
- پیشگیری از برونوکواسپاسمر ناشی از فعالیت

مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر می‌باشد:
- بزرگسالان:
- آسم: ۱۰ میل گرم یک بار در روز در عصرها
 - رینیت آلرژیک: ۱۰ میل گرم یک بار در روز
 - برونوکواسپاسمر ناشی از فعالیت: ۱۰ میل گرم حداقل ۲ ساعت قبل از فعالیت. دوز بعدی در فاصله‌ی زمانی ۲۴ ساعت از دوز قبل نباید استفاده شود.

اختلال عملکرد کبد:

- در بیماران با نارسایی کبدی خفیف تا متوسط و سیروز، متابولیسم کاهش می‌یابد و حذف طولانی‌تر می‌شود.
- سالمندان:
- نیمه عمر پلاسمای دارو کم بالاتر است. تنظیم دوز نیاز نمی‌باشد.
- کودکان:
- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان کوچکتر از ۱۲ ماه مبتلا به آسم، کودکان کوچکتر از ۶ ماه با رینیت آلرژیک پایدار و کودکان کوچکتر از ۶ سال با برونوکواسپاسمر ناشی از فعالیت ثابت نشده است.

عواض جانی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی از عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.
- عوارض جانی با شیوع بیشتر از ٪۲
 - عوارض گوارشی: تهوع، درد شکم، اسهال، سوزش سر دل
 - عوارض پوستی: کهیر، اگزما، عفونت پوست، درماتیت آتوپیک
 - عوارض تنفسی: برونشیت حاد، گلو درد، پنومونی، رینیت، آبریزش بینی، عطسه، آنفولانزا
 - التهاب گوش میانی، عفونت دندان، درد گوش، التهاب زبان، سر درد، التهاب ملتحمه

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای سازنده‌ی آن

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید.