

فلوکونازول

قرص

یادآوری:

این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری ننمایید.

مکانیسم عمل:

فلوکونازول مهارکننده انتخابی سیتوکروم P-450 قارچ می باشد.

موارد مصرف:

- کاندیدیازیس واژینال.
- کاندیدیازیس دهانی - حلقی و مری.
- مننژیت کریپتوکوکی.
- پیشگیری: فلوکونازول در کاهش میزان عفونت های کاندیدیایی در بیمارانی که تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته، شیمی درمانی یا پرتو درمانی می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

● بزرگسالان:

- ۱- کاندیدیازیس واژن: ۱۵۰ میلی گرم از طریق خوراکی و به صورت یک بار در روز مصرف می شود.
- ۲- کاندیدیازیس دهانی - حلقی و کاندیدیازیس مری: روز اول ۲۰۰ میلی گرم از طریق خوراکی، سپس روزانه ۱۰۰ میلی گرم مصرف می شود. به منظور کاهش احتمال عود درمان باید حداقل تا دو هفته ادامه یابد.
- ۳- کاندیدیازیس سیستیک: در مطالعات تا مقدار ۴۰۰ میلی گرم به صورت روزانه مورد استفاده قرار گرفته است.
- ۴- عفونت های ادراری و پریتونیت: در تعدادی از بیماران ۵۰-۲۰۰ میلی گرم روزانه مورد استفاده قرار گرفته است.

● کودکان:

از جدول زیر جهت محاسبه مقدار مصرف اطفال استفاده نمایید.

مقدار مصرف فلوکونازول در کودکان در مقایسه با بزرگسالان	
کودکان	بزرگسالان
۳ میلی گرم/کیلوگرم	۱۰۰ میلی گرم
۶ میلی گرم/کیلوگرم	۲۰۰ میلی گرم
۱۲ میلی گرم/کیلوگرم	۴۰۰ میلی گرم

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به فلوکونازول یا ترکیبات هم خانواده با این دارو.

موارد احتیاط:

- آسیب کبدی: مصرف فلوکونازول در موارد نادری با سمیت شدید کبدی همراه بوده است.
- مشکلات پوستی: بیماران در موارد نادری از درمان، دچار اختلالات پوسته ریزی می شوند.

مصرف در حاملگی:

در بارداری جزء گروه C قرار دارد.