

## طریقه پاک کردن افشانه اسپری

افشانه اسپری شما باید حداقل یک بار در هفته تمیز شود.



### جهت انجام این کار

افشانه را به سمت بالا کشیده تا از بطری جدا شود.



افشانه و درپوش محافظ را با آب گرم بشویید.



با تکان دادن، آب آن را خارج کرده و قبل از قرار دادن آن بر روی بطری، اجازه دهید افشانه و درپوش در دمای اتاق خشک شوند.

## توجه :

اگر افشانه مسدود شده باشد مانند شکل آن را خارج کرده و در آب گرم خیس کنید. سپس افشانه را زیر شیر آب سرد بشویید. اجازه دهید افشانه قبل از قرار گرفتن بر روی بطری خشک شود.

**هیچگاه از اسنچاق یا وسایل نوک تیز جهت باز کردن روزنه افشانه استفاده نکنید. زیرا این کار باعث خراب شدن آن می شود.**

## نگهداری :

دارو را به صورت ایستاده، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. از خشک کردن و یا قرار دادن آن در معرض نور اجتناب گردد.

نام: آدرس: تلفن و وبسایت موسسه دارویی دارنده پروانه ساخت:

دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۲

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۵۴

وبسایت: [www.koushanpharmed.com](http://www.koushanpharmed.com)

## اطلاعات جهت استفاده پزشکان

# Flomist

هر باف اسپری حاوی

Fluticasone Propionate ..... 50 mcg

### خصوصیات

فلوتیکازون پروپریونات یک کورتیکواستروئید استنیتیک تری فلورینه با فعالیت ضد التهابی می باشد. مواد مصرف:

فلومیست جهت کنترل رینیت آلرژیک و غیر آلرژیک،

فصلی و دائمی تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

**بزرگسالان بالای ۱۲ سال:**

**دوز اولیه:** ۲ پاف در هر سوراخ بینی، یکبار در

روز یا ۱ پاف در هر سوراخ بینی، ۲ بار در روز

**دوز نگهدارنده:** ممکن است به روزانه ۱ پاف در هر

سوراخ بینی کاهش یابد.

**رینیت آلرژیک فصلی:**

۲ پاف در هر سوراخ بینی، یکبار در روز کفایت می کند.

**کودکان (۴-۱۱) سال:**

**دوز اولیه:** ۱ پاف در هر سوراخ بینی، یکبار در

روز. ممکن است به ۲ پاف در هر سوراخ بینی،

یکبار در روز افزایش یابد.

**دوز نگهدارنده:** روزانه ۱ پاف در هر سوراخ بینی

حداکثر: روزانه ۲ پاف در هر سوراخ بینی

برای استفاده در کودکان زیر ۴ سال توصیه نمی شود.

**منع مصرف:**

حساسیت مفرط به هر کدام از اجزای سازنده دارو.

**هشدارها و احتیاط ها:**

جایگزین کردن کورتیکواستروئیدهای سیستمیک با

کورتیکواستروئیدهای موضعی باعث همراه شدن علائم

نارسایی آدرنال می شود.

بعضی از بیماران ممکن است علائم قطع مصرف مانند

درد مفاصل و عضلات، سستی یا افسردگی را تجربه کنند

مصرف همزمان کورتیکواستروئیدهای داخل بینی با سایر

کورتیکواستروئیدها ممکن است باعث افزایش بروز

تشنه ها و علائم زیاد شدن کورتیکوئیدها و با سرکوب

محور هیپوفیز-هیپوتالاموس شود.

بیمارین فلومیست در بیماری که به علت سایر

بیماریها، استروئید مصرف می کنند باید با

احتیاط مصرف شود.

کورتیکواستروئیدهای داخل بینی وقتی که در دوزهای بالا استفاده می شوند، ممکن است باعث کاهش سرعت رشد شوند. فلومیست نباید بیشتر از دوز توصیه شده مصرف شود. مراقبتهای ویژه جهت بیماران با تور کولریز روی، عفونت های ویروسی و فارژی می مورد نیاز است. کودکانی که

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی را مصرف می کنند بسیار مستعدتر به عفونت نسبت به کودکان سالم هستند. البته مرغان و سرخچه برای مثال می تواند باعث عوارض کشنده و یا جدی در کودکانی که کورتیکواستروئیدهای سرکوب کننده ایمنی را مصرف می کنند، شود.

در درمانهای طولانی مدت توصیه می شود که فاکتورهای خونوی و عملکرد آدرنال تحت کنترل قرار گیرد.

در مطالعات بالینی با فلوتیکازون داخل بینی به ندرت عفونت بینی یا حلق با کاندیدا آلبیکانس به صورت توسعه یافته و یا موضعی دیده شده است. وقتی که چنین عفونتهایی توسعه می یابد ممکن است درمان موضعی ضد عفونت و قطع درمان با فلومیست توصیه شود.

**تداخلات دارویی :**

استفاده همزمان فلومیست با دیگر داروهایی که مهارکننده های قوی سیستم سیتوکرم P450 3A4 هستند مانند کتونازول و مهارکننده های پروتئاز مانند ریتوناویر ممکن است باعث افزایش سیستمیک فلوتیکازون شود.

**حاملگی:**

فلوتیکازون در زنان باردار - زمانی که منافع درمانی دارو بیشتر از اثرات مضر آن برای مادر و کودک باشد، استفاده می گردد.

**شودهی:**

فلوتیکازون در زنان شیرده زمانی که منافع درمانی دارو بیشتر از اثرات مضر آن برای مادر و کودک باشد، استفاده می شود.

**عوارض جانبی شایع شامل:**

سرردرد، فاریزیت (التهاب گلو) ، خونریزی از بینی، سوزش یا التهاب بینی، حالت تهوع و استفراغ، علائم اسهال، سرفه مزه و بوی نامطبوع می باشد.

**بسته بندی:**

اسپری بینی فلومیست حاوی ۱۰۰ دوز معین