

گرانول خوراکی سینکاست

موثنه لوکاست

این دارو به صورت ساشه‌های محتوی ۴ میلی‌گرم ماده موثره موثنه‌لوکاست (به صورت سدیم) تولید و در بسته‌بندی‌های ۱۴ عددی به همراه بروشور در یک جعبه ارائه می‌شود.

طبقه بندی درمانی

آنتاگونیست گیرنده لوکوترین، ضد آسم - ضد آلرژی

راهنمایی های عمومی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه.

- در صورت داشتن هرگونه سابقه بیماری و یا مصرف سایر داروها.

مقدار و نحوه مصرف

همیشه طبق دستور و دوز تعیین شده توسط پزشک و یا داروساز مصرف نمایید.

مقدار توصیه شده در کودکان ۶ ماه تا ۵ سال:

روزانه محتویات یک ساشه را، ترجیحاً عصرها، به صورت مستقیم در دهان بریزید، یا در ۵ میلی‌لیتر از شیر مادر یا شیر خشک حل کرده و یا با یک قاشق غذاخوری از غذای کودک (فقط پوره سیب، بستنی، هویج و یا برنج) مخلوط کرده و به کودک خوراند شود. توجه کنید که شیر، شیرخشک یا غذای کودک حتماً باید کاملاً خنک شده باشد.

توجه: دقت نمایید که این دارو فقط در شیر خشک یا شیر مادر حل شود، اما پس از خوردن دارو می‌توان از مایعات دیگر استفاده کرد. توجه نمایید که محتوای یک بسته را به صورت کامل با غذای کودک مخلوط کرده و همچنین کودک به صورت کامل همه آن را میل کند. بلافاصله بعد از باز کردن ساشه آن را حداکثر تا ۱۵ دقیقه مصرف کنید. اگر آن را با غذا مخلوط می‌کنید بلافاصله مصرف کرده و از نگه داری برای مصرف در ساعت‌های بعدی پرهیز کنید.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک خود مشورت کنید.

- عوارض شایع: اسهال، بیش‌فعالی، خارش و پوسته شدن پوست، راش پوستی، شکم درد، سر درد، تشنگی، افزایش سطح آنزیم‌های کبدی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی.

- عوارض زیر شایع نیستند ولی در صورت بروز سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید:

۱- واکنش‌های آلرژیک از جمله تورم صورت، لب‌ها، زبان و یا گلو که ممکن است سبب مشکل در تنفس یا بلعیدن شود.

۲- تغییرات مربوط به حالات روحی یا رفتاری مانند: تحریک پذیری شامل رفتارهای پرخاشگر و یا افسردگی.

۳- تشنج.

هشدارها

- اگر شرایط آسم و تنفس کودک شما رو به بدتر شدن می‌باشد، حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

- این دارو برای درمان حمله حاد آسم نمی‌باشد به همین دلیل برای کنترل حمله آسم از داروهایی که پزشک برای این منظور تجویز کرده است استفاده نمایید.

- مصرف دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکرده و همچنین بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

- مصرف این دارو در نوزاد زیر ۶ ماه توصیه نمی‌شود.

- در صورتی که کودک شما داروی آسپرین و یا ضدالتهاب‌های استروئیدی (NSAIDs) مصرف می‌کند حتماً پزشک خود را مطلع سازید زیرا این داروها آسم او را بدتر می‌کنند.

تداخلات دارویی

در صورتی که کودک شما داروهایی مانند فنوباریتال، فنی‌توزین، ریگامبین و یا هر داروی دیگری مصرف می‌کند حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگه دارید.

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

تاریخ آخرین بازمینی: بهمن ماه ۱۳۹۷

ساخت شرکت داروسازی پورسینا تهران - ایران