

بیماری‌ها، با توجه به نظر پزشک معالج ممکن است دوز اولیه بالاتری برای شما در نظر گرفته شود.

### در صورت فراموش نمودن یک یا چند نوبت از مصرف دارو چه باید کرد؟

اگر یک دوز دارو فراموش شود، بالاصله بعد از یادآوری می‌باشد دوز دارو تزریق گردد و سایر تزریق‌ها طبق برنامه قبلی ادامه داده شوند. مگر اینکه تزدیک دوره بعدی دارو باشد که در اینصورت نباید دور فراموش شده تزریق گردد و باستی تزریق طبق برنامه قبلی ادامه داده شود. در صورت فراموش شدن دوز پزشک خود را مطلع نمایید.

### در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو چه اقدامی انجام شود؟

از مصرف دوز اضافی دارو باید احتیاط گردد و در صورت مصرف دوز اضافی به صورت تصادفی، با پزشک یا داروساز خود براي توصیه های بیشتر تماس حاصل فرمایید.

### داروی سینورا® چه عوارضی دارد؟

هر دارو به مواراز اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز عوارض زیر با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید.

### عالم غفتون (تب، لرز، گلو درد، علائم انفلوآنزا) و اکتشافی‌های محل تزریق مانند فرمزی، سورم، تغییر رنگ محل، التهاب و درد

### سردرد و راش جلدی

در صورت بروز علائم ناخواشایند دیگر که احتمال می‌دهید ناشی از مصرف دارو باشد، داروساز یا پزشک خود را مطلع سازید. «

### شرطی نگهداری داروی سینورا® چگونه است؟

داروی سینورا® باید در مدت ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد (در یخچال نگهداری و از تزدیک محافظت شود).

دارو در جعبه اصلی و دور از نوک نگهداری شود.

دارو در مکانی دور از دسترس کودکان نگهداری شود. به هیچ عنوان از داروی تاریخ گذشته استفاده نکنید.

۴ میلی گرم در ۰/۰۸ میلی لیتر

سینورا® از پیش پر شده استریل در فیزیوجلت

داروی سینورا® چیست؟

سینورا® نام تجاری آدالیمومب است. داخل هر ابزار داروسان

خود کار یک سرنگ از پیش پر شده قرار دارد که حاوی ۰۴ میلی گرم

آدالیمومب در ۰/۰۸ میلی لیتر است. سینورا® در سنتزیندی‌های

۲ عددی به همراه پرگه بیمار عرضه می‌گردد

داروی سینورا® باید چه استفاده‌هایی شود؟

سینورا® باید کاهش علیم و نشانه‌هایی برای ازتریت روماتنید

و همچنین جلوگیری از پشرفت خربی ساختاری و بهمود

عملکرد چشمی و فیزیکی در بیماران بزرگسالی که به ازتریت

روماتنید متوسط تا شدید فعال مبتلا هستند و پاسخ مناسبی به

یک یا چند نوع از داروهای تعدیل کننده بیماری‌های روماتیسمی

نداشته تجویز می‌گردد. سینورا® یک متکوانول آنتی‌ایدی است

که به تنهایی به همراه با متکوانول‌ها و یا دیگر داروها در درمان

ازتریت روماتنید مصرف می‌شود. از دیگر مواد مصرف این

دارو متوان به بیماری‌های ازتریت ایدیوباتیک جوانان، ازتریت

پسرویانیک، اسپوندیلیت اتکلیوزن، بیماری کرون در بالغین و

کودکان، کولیت اولسراتیون، بلک پسرویاریز، بیماری پوستی

و بیماری‌های Hidradenitis Suppurativa

غير عقیوني اشاره کرد.

چه زمانی داروی سینورا® باید مصرف شود؟

در صورت حساسیت به آدالیمومب یا سایر اجزای تشکیل

دهنده فرمولواسون دارو، سینورا® باید مصرف شود.

همچنین مصرف این دارو در غفوت فعال و سا در بروخی از

سواره نارسایی قلبی متوسط تا شدید، منع مصرف دارد.

چه زمانی داروی سینورا® باید احتیاط مصرف شود؟

در غفوت‌های فالال-قبيل سل

در صورت داشتن ساقیه سل

در بدیخیمه‌ها

در ناقلین مزمن ویروس هپاتیت B

در واکنش‌های حساسیتی حاد

- در اختلالات عصبی
- در اختلالات خونی
- در تارسایی احتقانی قلب

در صورت بروز سندروم شبیه لوپوس

لازم به ذکر است:

- در صورت استفاده از داروی دیگر، با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

در صورتی که قرار است تحت هر گونه عمل جراحی از قبل اقدامات

دنده‌پزشکی قواریک‌پرینپل خود را در جریان بگذرانید

در صورت نیاز به آستیناسیون، پزشک خود را مطلع سازید.

در صورت بروز هرگونه علائم غیرطبیعی از قبیل شباب،

پیدا شدن زخم، خونریزی غیر عادی و یا احساس خستگی شدید پزشک خود را مطلع سازید.

به هیچ عنوان از داروی تاریخ گذشته استفاده نکنید.

در صورت مشاهده تغییر رنگ، ذره یا کدروت از مصرف

فراوراژه خوددادی شود.

دارو دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

توصیه می‌شود که هنگام استفاده از فراورده، نام و شماره

سری ساخت مخصوص به منظور حفظ سوابق سری‌های

ساخت استفاده شده، ثبت شود.

**صرف همزمان سینورا® با کدام داروها تداخل دارد؟**

این دارو ممکن است با برخی از دیگر داروهای صرقوی شما

تداخل داشته باشد. در صورت مصرف سایر داروها، مکمل‌ها و

فرآورده‌های گیاهی با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

**آیا مصرف سینورا® در دوران بارداری و شیردهی محظوظ است؟**

چنانچه در دوران بارداری (را شیردهی) هستید، پیش از مصرف

سینورا® با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

**چه مقدار داروی سینورا® باید مصرف شود؟**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک، معین می‌نماید. اما مقدار

صرف مخصوص دارو به شرح زیر است:

سینورا® به طور معمول ۴۰ میلی گرم هر ۲ هفته یکبار،

بصورت زیرجلدی تزریق می‌گردد. توجه نمایید که در برخی