

لیندان - گیلارانکو ۱٪

لیندان

لوسیون

دسته دارویی: ضد جرب یا گال

فارماکوکینتیک: لیندان به مقدار قابل توجهی از طریق پوست جذب می گردد.

موارد مصرف: لوسیون لیندان برای درمان آلودگی ناشی از سارکوپتس اسکابیه (گال) مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف: مقدار کافی از لوسیون لیندان را از گردن به پایین یک بار روی پوست خشک بمالید و خوب مالش دهید، بعد از ۸-۱۲ ساعت با آب کافی بشویید.

نکات قابل توصیه:

- ۱- تمام لباسها، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته شود.
- ۲- به علت سمی بودن دارو از تماس آن با دهان و چشم ها خودداری گردد.
- ۳- از مصرف دارو روی زخمهای باز، خراشیدگی و بریدگیها اجتناب گردد.
- ۴- تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز همزمان باید درمان گردند.
- ۵- این دارو برای استعمال خارجی است.
- ۶- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۷- در صورتی که بیمار قبل از مصرف دارو حمام گرفته است، قبل از کاربرد دارو، بایستی پوست بدن خود را خشک و خنک نماید.

۸- برای جلوگیری از آلودگی مجدد، از لباسهایی که به تازگی شسته و خشک شده اند، استفاده شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان سایر فرآورده های پوستی مانند کرم ها، لوسیون ها، پمادها یا روغنها با این دارو ممکن است جذب پوستی لیندان را افزایش دهد.

هشدارها:

- مصرف این دارو در شیرخواران، کودکان، افراد سالخورده و زنان باردار با احتیاط صورت گیرد.
 - مصرف لیندان در نوزادان نارس توصیه نمی شود.
- عوارض جانبی:** عوارض جانبی که در مصرف لیندان مشاهده می شود بسیار وابسته به کاربرد غلظتهای بیش از حد آن بر روی پوست در معالجه جرب و شپش می باشد.
- التهاب پوست، بثورات پوستی و علائم مسمومیت (CNS) ممکن است ظاهر شود.
- مصرف در بارداری:** در صورت نیاز نباید دارو را بیش از مقدار توصیه شده در زنان باردار مصرف نموده و استفاده از دارو نیز حداکثر دوبار در تمام طول آبستنی مجاز می باشد.
- مصرف در شیردهی:** عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است.



محصولی از شرکت داروسازی گیلارانکو

رشت - ایران

Lindane – Gilaranco 1%

Lindane

Lotion

Lindane Lotion USP 1%, has been prescribed by your doctor to help you get rid of scabies. These are very tiny bug- like animals that may have caused you discomfort and itching. When used properly, Lindane Lotion will work, but you need to be careful to follow these directions exactly if you are the one using Lindane Lotion, or if you are supervising the use of Lindane for a child. Here are the general directions, follow those directions carefully.

Before you use Lindane:

- Do not use any Lindane product on premature babies, as their skin may absorb more Lindane than their systems can handle.
- Do not use Lindane if you, or the person you are using it, upon, has any known seizure disorders or sensitivity to Lindane or any of the products ingredients.
- Children must not apply Lindane without adult supervision.
- Do not leave Lindane on skin for more than twelve (12) hours (remove Lindane with bath or shower 8-12 hours after application)
- Do not take Lindane internally.
- Keep Lindane away from mouth and eyes.
- Cover infants Hands and feet during treatment to prevent them from sucking and licking off Lindane .
- Do not use Lindane if there are open wounds, cuts, or sores on the skin- unless your doctor specifically tells you to.
- If applying Lindane Lotion to another person, wear rubber gloves, especially if you are pregnant or nursing mother.
- All recently worn clothing, underwear and pajamas, used sheets, pillow cases, and towels should be washed in very hot water or dry cleaned.
- Do not reapply Lindane if itching continues after first use. Itching after applications of Lindane Lotion may not be due to scabies, but may be normal sensation after successful treatment. Do not reapply without first obtaining the advice of your doctor.
- Do not reapply Lindane because you may think that "more is better". Additional Lindane applied beyond the recommended amount may be harmful.
- Lindane can be poisonous if not used properly.

While Lindane is generally safe and effective, overuse can be harmful and cause central nervous system toxicity for certain people particularly infants.

How to use Lindane Lotion:

- 1- Shake well.
- 2- Apply to dry skin in a thin layer and rub in thoroughly.
- 3- If a warm bath is taken before you apply Lindane, make sure the skin is dry and cool to the touch before applying.
- 4- Trim nail and apply the lotion under nails with a toothbrush (throw the toothbrush away after using it).
- 5- A total body application should be made from the neck down including soles of feet, unless otherwise directed by your doctor.
- 6- The lotion should be left on for 8 to 12 hours (usually overnight) and then removed by through washing (bath or shower).



GILARANCO Pharmaceuticals Co.
Rasht- Iran