

داروهای ضد آریتمی گروه la (کوتینیدین، پروکاتین آمید) و گروه III (امیدارون، سوتالول) – در مصرف همزمان احتمال بروز آریتمی قلبی به علت طولانی شدن فاصله QT در نوار قلب، ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد دیابت – در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون یا انسولین، مصرف همزمان این داروها با لوقولوکساسین ممکن است منجر به کاهش یا افزایش قند خون شود. لذا باش میزان قند خون توصیه می‌گردد.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی – مصرف همزمان ممکن است منجر به پارگی تاندون‌های شانه، دست، آشیل یا سایر تاندون‌ها گردد که نیاز به عمل جراحی داشته و یا آن که منجر به ناتوانی طولانی مدت باخصوص در افراد سالخورد می‌گردد.

وافارین – لوقولوکساسین باعث تشید اثرات وارفارین می‌گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پیشکش: می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
برای درمان عفونت:

بزرگسالان – ۲۰ تا ۷۵ میلی‌گرم یک بار در روز.

کودکان کمتر از ۱۸ سال – مصرف و مقارن یابد توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱ - دارو ممکن است با معده خالی یا همراه با غذا مصرف شود.

۲ - این دارو را همراه با مایعات فراوان به جلوگیری از بروز برخی اثرات ناخواسته دارو کمک می‌نماید.

۳ - به منظور حفظ مقدار نایابی از دارو در خون یا ادرار، مصرف هیچ یک از نوبتها را فراموش نکنید. همچنین دارو را مطابق با زمانها و فواصل زمانی تعیین شده مصرف نمایید. اگر دارو را یک بار در روز مصرف می‌کنید، آن را هر روز در یک زمان مشخص میل نمایید.

۴ - در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض بدای اوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را سریجیرید. از دوباره کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موارز ارتات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر - بدورات جلدی، خارش یا فرمزی پوست؛ درد یا گرفتگی شدید ناحیه شکم یا معده؛ حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار؛ آشتفتگی؛ تاول؛ اغتشاش شعره؛ اسهال آنکه شدید یا خونی؛ تب؛ توهمندی؛ درد، التهاب یا تورم ساق‌ها؛ شانه‌ها یا دست‌ها؛ جنون؛ احساس سوزش پوست؛ تغییر حس چشایی؛ پیوست؛ اسهال؛

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل درد یا تاراحتی معده یا شکم؛ تغییر حس چشایی؛ پیوست؛ اسهال؛

گیجی؛ خواب آلودگی؛ سردرد؛ منگی؛ تهوع؛ عصبانیت؛ اشکال در به خواب رفتن؛ خارش و ترشح واژن و استفراغ با پزشک خود میتوتر نمایید.

علایمی نظری درد یا گرفتگی شدید معده یا شکم؛ حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار؛ اسهال آنکه شدید یا خونی و تب ممکن است پس از قطع مصرف دارو بروز نماید. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید فوراً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶ - ۰۲۹۰۰۴۴۵۰۰۲۲۹

تلفن شکایات و گزارش عارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۴۴۵۰-۴۷۸۷ - شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰-۴۹۹۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
info@abidipharma.com
www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۹۷/۱۰/۲

References :

- 1) USP DI 2007, Volume II – Advice for the Patient®, pages : 999-1001
- 2) USP DI 2007, Volume I – Drug Information for the Health Care Professional, pages : 1823-1828
- 3) Drug Facts and Comparisons® 2016, pages : 2252-2261, 2266-2269
- 4) PDR® 64th edition, 2010, pages : 2629-2643

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

سبز

۱۳۵