

تاوانکس به صورت قرص های خوارکی، روکشدار، کشیده، خطدار، محدب و به رنگ تاریخی (۵۰۰ میلی گرم) و یا روکشدار، کشیده، بدون خط، محدب و به رنگ سفید (۷۵۰ میلی گرم) می باشد.

هر قرص به ترتیب حاوی ۵۰۰ میلی گرم و یا ۷۵۰ میلی گرم لوفولوكساسین (به صورت همی هیدرات) است.

تاوانکس درسته بندی های زیر توسط داروسازی دکتر عینی عرضه می شود:

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۵ عددی قرص ۵۰۰ میلی گرم

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۵ عددی قرص ۵۰۰ میلی گرم

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۵ عددی قرص ۷۵۰ میلی گرم

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۷ عددی قرص ۷۵۰ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

۱- ساقه حساسیت به لوفولوكساسین و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو، سایر فلوروکینولون ها و یا سایر ترکیبات وابسته به مشتقات فلوروکینولون.

۲- التهاب یا یارگی تاندون مربوط به مصرف داروهای گروه کینولون.

۳- مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات دقیق و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، لذا مصرف این دارو باید فقط تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی - این دارو ممکن است در شیر مادر ترشح شود و به دلیل امکان بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

۱- بی خطری و کارآی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.

۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

بیماری مغزی و سوتون فقرات شامل سفتی سرخرگاهی مغزی، بیماری صرع یا سایر حملات تشنجی - مصرف لوفولوكساسین ممکن است خطر بروز حملات تشنجی را افزایش دهد.

دیابت ملتوس (دیابت قندی) - لوفولوكساسین ممکن است باعث تغییر در میزان قند خون شود، لذا ممکن است باعث اختلال در کنترل میزان قند خون گردد.

بیماری کلیه - به دلیل کاهش دفع لوفولوكساسین از بدن، اثرات این دارو ممکن است افزایش باید.

برادی کاردی (آهسته شدن ضربان قلب) - لوفولوكساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT در بیماران مبتلا به برادی کاردی گردد.

هیپو کالمی (کاهش پتانسیم خون) - لوفولوكساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT شود.

موارد احتیاط :

۱- در صورت عدم پهلوی علایم طی چند روز از شروع مصرف دارو یا بدتر شدن آن، با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- از مصرف هم‌زمان داروهای ضد اسید حاوی الومینیم، کلسیم یا میزیم، دیدانوزین، مکمل های آهن، سوکرفیت و روی با این دارو برهیز نمایید. این داروها باعث جلوگیری از اثر پخشی مناسب لوفولوكساسین می گردند. لذا بهترین زمان مصرف این داروهای حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف لوفولوكساسین است.

۳- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث حساسیت بیشتر پوست نسبت به نور خورشید شود. تماس با نور خورشید حتی برای دوره های کوتاه مدت ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، پبورات جلدی، فرمزی، خارش یا سایر تغییرات رنگی پوست گردد. در صورت مشاهده واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- در صورت بروز بثورات جلدی یا سایر علایم ایکتیز های ازویکی، مصرف این دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

۵- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان از ازنگی و کار با سایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

۶- لوفولوكساسین ممکن است باعث درد، التهاب یا یارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علایم در دست ها، شانه ها و ساق ها، مصرف دارو را قطع نموده و بلا فاصله با پزشک تماس حاصل نمایید. از انجام فعالیت های وزر شی خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

۷- مصرف این دارو در برخی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین یا داروهای خوارکی پایین اورنده قند خون، ممکن است باعث هیپو گلیسمی (افت قند خون) گردد. علایم کمی قند خون باشد قبل از آن که منجر به بیهوشی گردد، درمان شود. این علایم در افواه مختلف ممکن است متفاوت بوده و شامل شستگی با ضعف، احساس اضطراب، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، رنگ پریدگی، اشکال در تمیزک، خواب آلودگی، گرسنگی شدید، سردرد، تهوع، عصبیت، ضربان سریع قلب و لرزش غیر طبیعی می باشد. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، مصرف دارو را قطع نموده و بلا فاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

۸- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به پایین بودن مقدار پتانسیم خون، ممکن است منجر به ضربان نند، کند یا تامظنم قلب گردد.

داخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد اسید حاوی آلومنیم، کلسیم، میزیم، دیدانوزین، سولفات آهن، سوکرفیت و روی - مصرف این داروها ممکن است جذب لوفولوكساسین را کاهش دهد، بنابراین مصرف هم زمان