

ایروکاست* به صورت قرص های خوراکی، جویدنی، صورتی رنگ، گرد و محدب (قرص جویدنی ۵ میلی گرم) و قرص های خوراکی، روکشدار، کرم رنگ، گرد و محدب (قرص ۱۰ میلی گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۵ و ۱۰ میلی گرم مونتۀ لوکاست (به صورت سدیم) است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
 - ۲- بارداری یا شیردهی
 - ۳- استفاده از سایر داروها
 - ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
 - ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات، بروز نابهنجاریهای مادرزادی گزارش نشده است. مصرف این دارو در طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک معالج باشد.
شیردهی - تاکنون مشخص نمی باشد که این دارو در شیر انسان ترشح شود، اگرچه در شیر موش های صحرایی شیرده ترشح می گردد. لذا مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج باشد.
هشدارها:

- ۱- در خصوص مصرف این دارو در کودکان کمتر از یک سال، هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.
 - ۲- مصرف این دارو در افراد سالمند بالاتر از ۶۵ سال در مقایسه با افراد جوان تر، تفاوتی را به لحاظ مؤثر بودن یا عوارض جانبی نشان نداده است.
 - ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
- آلرژی به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (اتودولاک، ایبوپروفن، کتوپروفن، ناپروکسن) - از مصرف همزمان این داروها با مونتۀ لوکاست خودداری شود.
- بیماری کبد - اثرات این دارو به دلیل دفع آهسته تر آن از بدن ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط:

- ۱- به منظور کارایی مناسب این دارو، مصرف آن باید در یک زمان مشخص در طی روز انجام گیرد، حتی اگر احساس شود که بیماری آسم بهبود یافته است.
- ۲- از قطع مصرف این دارو بدون دستور پزشک خودداری کنید، حتی اگر بنظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.
- ۳- در صورت عدم بهبودی علائم و یا بدتر شدن بیماری آسم، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۴- در هنگام مصرف این دارو، از کاهش مقدار یا قطع مصرف سایر داروهای ضد آسم بدون دستور پزشک خودداری نمایید، حتی اگر بنظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.