

## تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:  
فنوباریتال - غلظت خونی مونته لوکاست ممکن است کاهش یابد که منجر به کم شدن اثر دارو می گردد.  
پردنیزون - عوارض جانبی پردنیزون (مانند خیز) ممکن است افزایش یابد.

## مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:  
برای آسم یا آلرژی های فصلی:

قرص: بزرگسالان و نوجوانان ۱۵ سال به بالا - ۱ میلی گرم یک بار در روز

قرص جویدنی: کودکان ۶ تا ۱۴ سال - ۵ میلی گرم یک بار در روز

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو جهت جلوگیری از حملات آسمی تجویز می گردد و برای تسکین حمله ای که از قبل شروع شده است، بکار نمی رود.
- ۲- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - بالا رفتن بدون علامت آزمون های کبدی

نادر - وجود چرک در ادرار

شیوع نا مشخص - رفتار تهاجمی، آشفتگی، شوک حساسیتی فوری، آنژیوادم، هیپاتیت (التهاب کبد) صفراوی، توهم، طپش قلب، التهاب لوزالمعده، خارش، حملات تشنجی و کهیر

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند سردرد، درد شکمی یا معده، سرفه، دندان درد، گیجی، تب، سوزش سردل، بشورات جلدی، آبریزش بینی، خستگی یا ضعف غیر عادی، درد مفاصل، اسهال، اختلالات خواب، خواب آلودگی، خیز، افزایش خونریزی، بیخوابی، تحریک پذیری، ضعف عضلانی، تهوع، اختلال حس، بیقراری و استفراغ به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر درد شکمی، افزایش حرکات بدنی، اتساع شدید مردمک چشم، افزایش حساسیت چشم ها به نور، خواب آلودگی و تشنگی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

## شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۸،  
خیابان دکتر عبیدی  
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵  
تلفن: ۴۴۵۰۲۲۹ - ۲۱  
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۴۹۲۹  
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com  
پست الکترونیک: info@abidipharma.com  
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۴/۸/۱۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی  
تاسیس ۱۳۷۵